

**Załącznik do zezwolenia Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr R/j- 4/ 2008  
z dnia 24.04.2008 r**

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:** : Instytut Ochrony Roślin, ul. Miczurina 20, 60-318  
Poznań, tel. (061) 684 90 00, fax. (061) 867 63 01

**Producent:** Bayer CropScience AG, Landwirtschaftszentrum, Monheim, Alfred Nobel  
-Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy, tel/fax: 0049 21 733 380

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**  
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (0-prefiks-22) 572 36 20, fax:  
(0-prefiks-22) 572 36 03.

*Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia  
ryzyka dla ludzi i środowiska.*


## CALYPSO 480 SC

### Stosowanie środka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zawartość substancji aktywnej:

**tiachlopryd** /*(Z)*-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid/ (związek  
z grupy chloronikotynyli) - 480 g w 1 litrze środka.

**Zezwolenie MRiRW Nr R/j -4/2008 z dnia 24.04.2008r. na jednorazowe dopuszczenie do  
obrotu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 28 października 2008 r. środka ochrony roślin  
Calypso 480 SC**



Szkodliwy

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

Ograniczone dowody działania rakotwórczego

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się  
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym



**Uwaga:**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## **I OPIS DZIAŁANIA**

Calypso 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w kukurydzy.

W roślinie działa systemicznie.

## **II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **KUKURYDZA**

- zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa *Diabrotica virgifera* Le Conte

Zalecana dawka 0,2 l/ha

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować jeden raz w sezonie. W przypadku dwóch zabiegów stosować przemiennie ze środkiem Karate Zeon 050 CS.

**1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować :**

- do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia  
**albo**

- do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później

**2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych w 2008 r. przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:**

-zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika

#### **UWAGI:**

1. Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10° C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

### **III OKRES KARENCJI**

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

14 dni

### **IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT**

(okres zapobiegający zatruciu)

**NIE DOTYCZY**

### **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° i nie wyższej niż 30° C.

Przechowywać pod zamknięciem..

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpad y komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

## **UWAGA**

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

## **VIII ANTIDOTUM:**

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

## **IX POMOC MEDYCZNA**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

W sytuacjach, w których wymagana inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31	Rzeszów –(0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99	Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83	Tarnów - (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00	Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46	Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -